

Leiðandi
vettvangur í tíu ár



Áhrif efna- og eðlisfræði fiska á los



Sæmundur Elíasson

7.Nóvember 2019



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN

ISI ICELAND
SEAFOOD



HAMPIÐJAN



Hrifa Óhásid

Hvað er los?

- Los (gaping á ensku)
- Birtist sjónrænt þegar fiskur er flakaður, rifur eða holur sjást þá í flaki og hold fær lina áferð
- Í víðri skilgreiningu nær los í fiski yfir sundurlausn vöðvalaga vegna niðurbrots vöðvapróteina
- Álag og hnask getur þá veikt samloðun vöðvalaga og valdið áferðargalla



Uppbygging vöðva

- x1: Í fiskflaki eru vöðvalögin yfirleitt greinileg.
- x10: Á milli vöðva fiskholds er bandvefshimna.
- x100: Bandvefspræðir milli vöðvaþráða
- Bandvefurinn tengist síðan beinagrind fisksins




Fisktegundir

Þorskur



Lax



Hnakkasprunga

- Langsprungur, þvert á lagskipti vöðva
- Opnast yfirleitt vegna meðhöndlunar
- Álag á vöðva vegna veiðarfæra eða falls/þyngdarafls



Gæðaflokkun flaka út frá losi

- **Flokkur 1:** Áferð á flaki stíf, ekkert los, langsprunga á vöðvaskilum undir 3 cm að lengd.
- **Flokkur 2:** Áferð stíf, lítilsháttar los í undir 20% af flatarmáli flaks eða 1-3 litlar langsprungur.
- **Flokkur 3:** Áferð frekar mjúk, lítilsháttar los í undir 50% af flatarmáli flaks eða yfir 3 langsprungur.
- **Flokkur 4:** Áferð mjúk, lítilsháttar los í 50-75% af flatarmáli flaks eða greinilegt og djúpt los á minna svæði eða djúpar langsprungur í 20% flaks.
- **Flokkur 5:** Áferð mjúk, greinilegt los í yfir 75% af flatarmáli flaks eða djúpar langsprungur. Vöðvaflögur skiljast að og flak getur hreinlega dottið í sundur.



Grade 1



Grade 1



Grade 2



Grade 3



Grade 3



Grade 4



Virðiskeðjan – áhættustaðir loss

Veiðar

Forvinnsla

**Framhalds-
vinnsla**

Dreifing

Markaðir


Neytendur



Meðhöndlun



Tími




Hitastig

Helstu ástæður loss

- Hitastig (áhrif á niðurbrotsferli próteina)
- Meðhöndlun (álag á fisk)
- Dauðastirðnun (tími og hitastig)
- Stærð fiska og holdafar
- Orkuástand fiska (árstíðarsveiflan)
 - Getur munað 40% orku fyrir og eftir hrygningu
- Orkuástand fiska (barátta í veiðarfæri)


Árstíðarbundin áhrif

Tengist orku og ástandi fisks eftir hrygningu




Veiðisvæði og árstími







Desember
til febrúar




Mars til
maí



Júní til
ágúst

September
til
nóvember



Orkubúskapur fisks

- Orka safnast í fitu og vöðvum
- Eftir dauða verður stirðnun (rigor mortis) sem veldur samdrætti vöðva
- Hitastig hefur lykiláhrif á orkubúskap fisks eftir dauða og þar með afleiðingar dauðastirðnunar á vöðva



Allt að 30% samdráttur flaka



Flök í dauðastirðunarferli



Helstu mótvægisaðgerðir

- Kæling
- Frysting fyrir dauðastirðnun
- Meðhöndlun, lágmarka álag
- Aðferðafræði við veiðar og vinnslu
 - Tími og staðsetning



Leiðandi
vettvangur í tíu ár



Þakkir



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN